



Imodium®

munsönderfallande tabletter

Lindrar diarré inom **1 timme***.

*efter intag av 2 tabletter (4 mg)

Löser snabbt upp sig på tungan
och behöver inte sköljas ner med vatten.



Med
mintsmaak



Smidigt
på resan
eller på
språng



Kan underlätta vid svårigheter med
att svälja tabletter.



Hjälper tarmen att återfå sin normala
hastighet, för fastare avföring och
färre akuta toalettbesök.



Hjälper till att motverka vätske- och
saltförluster genom att normalisera
tarmens hastighet.

Imodium® (loperamid) tablett/munsönderfallande tablett. Vid tillfällig diarré. Imodium Plus (loperamid, dimetikon) tablett. Vid tillfällig diarré förenad med magknip, uppkördhet och gasbildning. Ej vid blod i avföringen, hög feber, graviditet eller amning. Enbart från 12 år. **Läs alltid bipacksedeln noga**, särskilt vid annan sjukdom. Använd max 2 dygn utan läkarkontakt. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar. Vid diarré är det viktigt att dricka mycket. Läkemedel.

©McNeil Sweden AB, Box 4007, 169 04 Solna, 2026. SE-IMO-2026-302972

Imodium®

IMODIUM® erbjuder olika alternativ för lindring av tillfällig diarré beroende på behov och behandlingspreferens.



IMODIUM® munsönderfallande tabletter

Vid tillfällig (akut) diarré

Från 12 år

**Lindrar diarré inom 1 timme*.
Löser snabbt upp sig på tungan och
behöver inte sköljas ner med vatten.**

- Smidigt på resan och kan underlätta vid svårigheter med att svälja tabletter.
- Hjälper tarmen att återfå sin normala hastighet och absorbera mer vätska och salter igen – för fastare avföring och färre akuta toalettbesök.
- Påverkar inte normalfloran i tarmen.
- Har mints smak.
- Laktosfri.

*vid intag av 2 tabletter (4 mg)



IMODIUM® tabletter

Vid tillfällig (akut) diarré

Från 12 år

Lindrar diarré inom 1 timme*.

- Hjälper tarmen att återfå sin normala hastighet och absorbera mer vätska och salter igen – för fastare avföring och färre akuta toalettbesök.
- Påverkar inte normalfloran i tarmen.

*vid intag av 2 tabletter (4 mg)



IMODIUM Plus® tabletter

Vid tillfällig (akut) diarré förenad med magknip, gasbildning och uppblåsthet.

Från 12 år

Dubbelverkande – lindrar både diarré och följsymtom som gaser och magknip.

- Löser upp gasbubblorna i magtarmkanalen.
- Hjälper tarmen att återfå sin normala hastighet och absorbera mer vätska och salter igen – för fastare avföring och färre akuta toalettbesök.
- Påverkar inte normalfloran i tarmen.
- Har vaniljsmak.
- Laktosfri.

Imodium® (loperamid) tablett/munsönderfallande tablett. Vid tillfällig diarré. Imodium Plus (loperamid, dimetikon) tablett. Vid tillfällig diarré förenad med magknip, uppkördhet och gasbildning. Ej vid blod i avföringen, hög feber, graviditet eller amning. Enbart från 12 år. **Läs alltid bipacksedeln noga**, särskilt vid annan sjukdom. Använd max 2 dygn utan läkarkontakt. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar. Vid diarré är det viktigt att dricka mycket. Läkemedel.