

Pepcid®

Lindrar tillfällig halsbränna och sura uppstötningar

Effekten kommer efter **ca. 30 minuter**.
Verkar i upp till **12 timmar**.



För lindring hela dagen

PEPCID® lindrar symtom vid tillfällig **halsbränna och sura uppstötningar** genom att minska produktionen av magsyra.

PEPCID® börjar verka efter **ca. 30 minuter** och 1 tablett kontrollerar magsaftsproduktionen i upp till **12 timmar**.

Ta **1 tablett vid behov** för symtomlindring eller ta **1 tablett 30 minuter före måltid** vid symtom i samband med intag av mat eller dryck.*

*Högst 2 tabletter per dygn i högst 2 veckor.

Pepcid® (famotidin) tablett. Läkemedel innehållande H2-antagonist för symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Från 12 år. Max 2 veckors behandling. Tala med läkare innan användning om du har halsbränna för första gången, nya symtom eller oavsiktligt har gått ner i vikt. Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor. Ej vid graviditet eller amning. **Läs alltid bipacksedeln noga**, särskilt vid annan sjukdom eller allergi. ©McNeil Sweden AB, Box 4007, 169 04 Solna, 2026. SE-PEP-2026-303306